



นางณัฐพร ชัยพรหมเขียว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

Vision : โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลตัวอย่าง


ที่มาและความสำคัญ



การฆ่าตัวตายสำเร็จในวัยรุ่น ปี 59-61 จำนวน 2,0,2 คน
ปี 2562 (ตค.ปี 61-มีค.62 = 1 คน)

การพยายามฆ่าตัวตายจำนวน 15,3,6 คน
ปี 2562 (ตค.ปี 61-มีค.62 = 10 คน)

โรคซึมเศร้าที่ไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้อง การเข้าถึงบริการโรค
ซึมเศร้าน้อย นำไปสู่การฆ่าตัวตาย



Vision : โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลตัวอย่าง

แนวคิดพื้นฐาน



การบำบัดแบบ CBT : Aaron T.Beck ได้พัฒนาเมื่อช่วง1960
ได้พัฒนาสำหรับผู้ป่วย depression

มีโครงสร้างชัดเจน ระยะเวลากระชับ เป็นการบำบัดที่เน้นปัจจุบัน
มุ่งไปที่การแก้ไขปัญหาปัจจุบันและการปรับความคิดที่บิดเบือนไปของ
ผู้ป่วย(Beck, 1964)

การบำบัดแบบMI : การบำบัดทางจิตวิทยาโดยMiller & Rollnick
(1991) มีเป้าหมายผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เน้นการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและ
แก้ปัญหา(มองอนาคต กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง)

Vision : โรงพยาบาลอุเชิยวเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลตัวอย่าง

วัตถุประสงค์



เพื่อศึกษาผลการบำบัดเพื่อสร้างแรงจูงใจร่วมกับการปรับความคิด
และพฤติกรรมในวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าและความคิด ฆ่าตัวตาย
ในโรงพยาบาลอุเชียวเฉลิมพระเกียรติ



Vision : โรงพยาบาลอุเชียวเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลตัวอย่าง



การบำบัดระยะที่1 การประเมินและ
เสริมสร้างแรงจูงใจ

การบำบัดระยะที่2 การเปลี่ยนแปลงความคิด
และพฤติกรรม

การบำบัดระยะที่3 เรียนรู้การแก้ไขปัญหา
การเสริมสร้างการจัดการอารมณ์ด้านลบ

การบำบัดระยะที่4 การติดตามประเมินผล

❗ไม่มีความคิด/
พฤติกรรมฆ่าตัวตาย



วิธีการวิจัย



การศึกษาเชิงพรรณนา

การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่วัยรุ่นที่มีอายุ 12-20 ปี

จำนวน 8 คน

ที่มาใช้บริการแผนกสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พระเกียรติ มีการประเมินภาวะซึมเศร้าโดยใช้แบบประเมิน PHQ-A ซึ่งมีภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับปานกลาง ถึง ระดับรุนแรง ได้รับการวินิจฉัยโรคตาม ICD-10 ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและได้รับการรักษาด้วยยาต้านเศร้าร่วมด้วย



Vision : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พระเกียรติเป็นโรงพยาบาลตัวอย่าง

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา นำเสนอค่าความถี่ ร้อยละ



เครื่องมือในการประเมิน



เครื่องมือในการประเมิน PHQ-A พัฒนาขึ้นโดย วิมลวรรณ ปัญญาอ่อนและคณะ (2561) ผู้ป่วยทุกคนจะถูกประเมินก่อนเข้ารับการบำบัด ระหว่างการบำบัด ดิ้นสุดการบำบัด และหลังการบำบัด 1 เดือน.

แบบวัดความตั้งใจในการฆ่าตัวตาย มี scale = 10 คะแนน ใช้ทุกครั้งที่ในการสนทนา

แบบวัดอุณหภูมิใจ มี scale = 10 คะแนน ใช้ทุกครั้งที่ในการสนทนา

Vision : โรงพยาบาลอุเชียวเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลตัวอย่าง

การพิทักษ์ผู้ป่วย



โดยให้ข้อมูล

อธิบาย
วัตถุประสงค์

การรักษา
ความลับ



Vision : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พระเกียรติเป็นโรงพยาบาลตัวอย่าง

การบำบัด



- ทำการบำบัดแบบรายบุคคล
(จำนวน 8 ครั้งใช้เวลา 45-60 นาที ทุก 1 อาทิตย์)
- ผู้บำบัดเป็นพยาบาลจิตเวช จบปริญญาโท พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
- ผ่านการอบรมหลักสูตร CBT และMI ผ่านการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ



Vision : โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลตัวอย่าง

รูปแบบการบำบัดประกอบด้วย



ระยะที่ 1 การประเมินและเสริมสร้างแรงจูงใจ (2 ครั้ง)

ครั้งที่ 1 สร้างสัมพันธภาพ ประเมินคัดกรองภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
สัมภาษณ์ค้นหาปัญหา วัดความตั้งใจในการฆ่าตัวตาย /ตั้งเป้าหมายร่วมกัน

เน้นการดูแลอาการทางกาย ให้ฝึกจินตนาการปรับเปลี่ยนสมอง

การออกกำลังกาย และการอยู่กับธรรมชาติ



“หัวใจยื้ม แก้มแย้ม ตายิ้ม” ผลที่เกิดขึ้น
คำพูดของเด็กหลังการฝึกจินตนาการที่นำไป
ปฏิบัติต่อที่บ้าน

Vision : โรงพยาบาลอุเชิยวเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลตัวอย่าง



สื่อการสอน VDO ของพญ.คุณภู่ จิ่งศิริกุลวิทย์



รูปแบบการบำบัด

การมีส่วนร่วมของครอบครัว / ของโรงเรียน / ให้การบ้าน



Vision : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พระเกียรติเป็นโรงพยาบาลตัวอย่าง

ไออาร์ของหนู



ตารางบันทึกความถนัดของหนู

วันที่	เหตุการณ์ที่ไม่สบายใจ	ความคิดความรู้สึกต่อเหตุการณ์นั้น	อารมณ์และพฤติกรรม	ความคิดใหม่	อารมณ์และพฤติกรรมใหม่
3 พ.ค. 2562	วันนี้เป็นวัน ประกาศผล หรือแข่งขันกับ เพื่อนๆ ในวิชา คณิตศาสตร์ แต่ฉันกลับไม่ ได้ลำดับที่ดี เลย ฉันรู้สึก เสียใจมาก	ฉันเสียใจมาก ที่ฉันทำคะแนน ไม่ดี ฉันคิดว่า ฉันยังไม่เก่ง พอที่จะแข่งขัน กับเพื่อนๆ ได้ ฉันคิดว่าฉัน ต้องพยายาม มากขึ้น	ฉันรู้สึก ผิดหวังมาก ฉันคิดว่าฉัน ยังไม่เก่งพอ ที่จะแข่งขัน กับเพื่อนๆ ได้ ฉันคิดว่าฉัน ต้องพยายาม มากขึ้น	ฉันคิดว่าฉัน ยังไม่เก่งพอ ที่จะแข่งขัน กับเพื่อนๆ ได้ ฉันคิดว่าฉัน ต้องพยายาม มากขึ้น	ฉันคิดว่าฉัน ยังไม่เก่งพอ ที่จะแข่งขัน กับเพื่อนๆ ได้ ฉันคิดว่าฉัน ต้องพยายาม มากขึ้น
24 พ.ค. 62	วันนี้เป็นวัน สอบวิชา คณิตศาสตร์ แต่ฉันกลับไม่ ได้ลำดับที่ดี เลย ฉันรู้สึก เสียใจมาก	ฉันเสียใจมาก ที่ฉันทำคะแนน ไม่ดี ฉันคิดว่า ฉันยังไม่เก่ง พอที่จะแข่งขัน กับเพื่อนๆ ได้ ฉันคิดว่าฉัน ต้องพยายาม มากขึ้น	ฉันรู้สึก ผิดหวังมาก ฉันคิดว่าฉัน ยังไม่เก่งพอ ที่จะแข่งขัน กับเพื่อนๆ ได้ ฉันคิดว่าฉัน ต้องพยายาม มากขึ้น	ฉันคิดว่าฉัน ยังไม่เก่งพอ ที่จะแข่งขัน กับเพื่อนๆ ได้ ฉันคิดว่าฉัน ต้องพยายาม มากขึ้น	ฉันคิดว่าฉัน ยังไม่เก่งพอ ที่จะแข่งขัน กับเพื่อนๆ ได้ ฉันคิดว่าฉัน ต้องพยายาม มากขึ้น

ไม่จากคอกจากบ้าน ไม่จากต้น ไม่จากเล่น
ไม่จากคุยกับใครด้วย พ่อแม่ของหนูเป็นคนดี
อยู่เป็นเพื่อน

แม่ หนู รู้สึกเป็นห่วง ไม่ได้ออกกำลังกาย
ไม่ได้จากบ้านมาเลย แม่เป็นห่วงมาก แม่เป็นห่วง
ฉันด้วย แม่ไปทำอะไรไม่ได้เลย

ทำตัวไรสาระ เรื่องมาก เป็นภาระ ไร้ค่า
เรื่องงาน ไปไหนมาไหนทำอะไร ทำอะไรมาทำไม่เสร็จ
คนหัวขบ 6 โคนนี้เป็นคนหัวขบแล้ว

เลือก เลือกมีค่ามาก ฉันมีเงินมากเลือกอะไรก็ได้
คนดีที่ 1 หรือ 2 ข้างว่าดีจริง ฉันดีจริงๆ

ไม่จากพ่อใครเลย รวมตัวด้วย
4/19 วันนี้ไปหา พ่อมาไปเล่นน้ำ เล่นกับแม่
สุดจิต 55555 ตอนกลับบ้านมา แม่ถามว่า
ดีใจดี (1) ตอนเช้าขบขบของไปก็หัวเราะ

Vision : โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลตัวอย่าง

ระยะที่ 2 เปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรม(3 ครั้ง)

- ครั้งที่ 3 สร้างสัมพันธภาพต่อเนื่อง อธิบายรูปแบบ CBT เชื่อมโยงความคิด พฤติกรรม และค้นหาความคิดอัตโนมัติทางลบ / ให้ความรู้



แผนภาพสาเหตุที่แท้จริงของความทุกข์




เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น(ปัญหา)ไม่ได้เป็นสาเหตุของการเกิดอารมณ์ และพฤติกรรมโดยตรง แต่เกิดจากกระบวนการการคิดที่มีต่อ เหตุการณ์นั้น ซึ่งเกิดขึ้นแบบทันที(อัตโนมัติ)

- **ครั้งที่ 4** ฝึกจับ ความคิดอัตโนมัติทางลบ ฝึกหยุดความคิดทางลบ



ใช้เทคนิค บทบาทสมมุติ
และกระดาษที่มีจุดเล็กๆ หนึ่งจุดตรงกลาง



Vision : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พระเกียรติเป็นโรงพยาบาลตัวอย่าง

- ครั้งที่ 5 พิสูจน์ตรวจสอบความคิดอัตโนมัติทางลบ ฝึกหยุดความคิดทางลบ ฝึกเปลี่ยนความคิดใหม่



ตารางบันทึกความคิดอัตโนมัติ

วันที่	เหตุการณ์ที่ไม่สบายใจ	ความคิดความรู้สึกต่อเหตุการณ์นั้น	อารมณ์และพฤติกรรม	ความคิดใหม่	อารมณ์และพฤติกรรมใหม่
3 พฤษภาคม 2562	วันนี้เป็นวันประชุมสัปดาห์ ต้องประชุมร่วมกับเพื่อนร่วมงาน และเพื่อนในคณะ ประชุมสัปดาห์ กัน เยอะจน ไม่ได้พักหายใจ	ท้อแท้ใจมาก ทั้งๆที่ประชุมเสร็จแล้ว แต่ยังรู้สึกไม่สบายใจ เพื่อนร่วมงาน เพราะทุกคนคิดว่า ทุกคนจะได้พัก อยู่คนเดียวกับครอบครัว นี่อีก คนก็เสียใจ มากแล้ว	จนรู้สึก พักใจ จนเสียใจ พักใจ แล้วจนรู้สึก ความเครียด น่าอะไรมาก แล้วอีก ดีขึ้น	จริงๆแล้วเพื่อน กันจริงๆก็ ไม่ได้คุยกัน ตลอดอยู่แล้ว สักวันพอเรา ไปเราก็ได้พัก กันอยู่ดี	จนรู้สึก ดีขึ้น มีความสุข สักใจ
24 พฤษภาคม 62	เพื่อนร่วมงาน ได้ไปประชุม อย่างช้าๆ จนหมด	จนรู้สึกไม่สบายใจ แล้วคิดว่าทำไม เพื่อนคนนั้น อยู่คนเดียว อย่างนี้ อย่างนี้	จนรู้สึก ดีขึ้น แล้ว ดีขึ้น แล้ว ดีขึ้น แล้ว	จริงๆแล้วเพื่อน กันจริงๆก็ ไม่ได้คุยกัน ตลอดอยู่แล้ว สักวันพอเรา ไปเราก็ได้พัก กันอยู่ดี	จนรู้สึก ดีขึ้น แล้ว ดีขึ้น แล้ว ดีขึ้น แล้ว

ไม่จากออกจากบ้าน ไม่อยากตื่น ไม่อยากเล่น
ไม่ออกจากบ้านไปไหนเลย พอหมดเวลาเลย ก็คิดว่า
อยู่บ้านนี่แหละ


แล้ว ก็ รู้สึกแย่มากๆ ไม่ได้ทำอะไรเลย
ไม่ได้ทำอะไรเลย เพราะว่า เป็นภาระแบบนี้นะมันแย่มาก
มันเครียดไปทำอะไรไม่ได้เลย

พักใจไว้ละ เรื่องมาก เป็นภาระ ไร้ค่า
เรื่องมาก โทษหาคนอื่นทำไม ทำเรื่องมาทำไม
คนอื่นอย่าไปยุ่งกับเรื่องของเรา

เลือก เลือกมีค่ามากๆ เลือกมีเงินเลือกมีครอบครัว
คนเดียวยังดีกว่าอยู่คนเดียวคนเดียวคนเดียวคนเดียว

ไม่จากออกไปไหนเลย รวมกับตัวเองด้วย
ไม่จากออกไปไหนเลย รวมกับตัวเองด้วย



4/19 วันนี้ไปหา พามาไปเล่นน้ำ เล่นกับหมา
สุดจืด 55555 ตอนกลับฝนตก พามาเล่นน้ำ
ก็สนุก สนุกดี (55) ตอนจึกจึกมองไปที่ท้องฟ้า



ระยะที่ 3 เรียนรู้การแก้ไขปัญหาการเสริมสร้าง การจัดการอารมณ์ด้านลบ(2 ครั้ง)



ครั้งที่ 6 เรียนรู้ธรรมชาติของอารมณ์ และฝึกทักษะการจัดการอารมณ์ด้านลบ ฝึกเลือกปัญหาที่ต้องแก้ แนวทางแก้ไข



Vision : โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลตัวอย่าง

ครั้งที่ 7 ทบทวนปัญหา ค้นหาแนวทางแก้ไขหลากหลายวิธี ฝึกรอยู่กับปัจจุบัน



- เช่น ปัญหาถูกเพื่อนเอาเปรียบเรื่อง ลอการบ้าน การทำรายงานถูกเพื่อนบังคับให้จ่ายเงินคนเดียว

วิธีที่	วิธีแก้ปัญหา	ข้อดีของวิธีนี้	ข้อเสียของวิธีนี้
1	ทำข้อตกลงร่วมกัน	จะได้เข้าใจในแนวทาง กติกาของกลุ่ม	ไม่มี
2	คนที่ไม่มีส่วนร่วมจะไม่ มีชื่อในรายงาน	ยุติธรรม	เพื่อนจะรังแกอีก
3	ไม่มาร่วมทำงานจะถูก ปรับ	เพื่อนกลัวถูกปรับจะเข้า มาช่วยมากขึ้น	น่าจะมีคนที่ไม่ทำ ตามกติกาอยู่ส่วน น้อย
4	ย้ายไปเรียนที่อื่น	ไม่ต้องเจอปัญหาอีก	ต้องเริ่มต้นใหม่ทุก

เลือกที่จะใช้ ข้อที่ 1 และ 3 ผลกระทบน้อย



Vision : โรงพยาบาลอุเชียวเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลตัวอย่าง

ระยะที่ 4 การติดตามประเมินผล (1 ครั้ง)



ครั้งที่ 8 ทบทวนการเรียนรู้ การตั้งเป้าหมายในชีวิต เน้นย้ำแรงจูงใจในการมีชีวิตอยู่ ส่งเสริมศักยภาพในการดูแลตนเองที่ดีขึ้นและสร้างสรรค์สิ่งดีงามได้ ป้องกันการกลับเป็นซ้ำ และนัดติดตามอีก 1 เดือนต่อไป



Vision : โรงพยาบาลอุเชิยวเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลตัวอย่าง

ลำดับ	เพศ	อายุ	การศึกษา	อาชีพ	ระดับคะแนน ชิมเต้า	พยายามฆ่าตัว ตาย	วิธีการ
1	ชาย	18	ม,6	นักเรียน	มาก	1 ครั้ง	ผูกคอต
2	หญิง	19	ม,6	นักเรียน	รุนแรง	อาทิตย์ละ 1-2ครั้ง (10+ครั้ง)	กรีดข้อมือ
3	หญิง	18	ม,6	นักเรียน	ปานกลาง	มีความคิด	-
4	หญิง	17	ม,5	นักเรียน	รุนแรง	มีความคิด	-
5	หญิง	20	ม,3	รับจ้าง	รุนแรง	3 ครั้ง	กินยาเกินขนาด
6	หญิง	18	ม,3	นักเรียน	รุนแรง	3ครั้ง	กินยาเกินขนาด
7	ชาย	18	ม,6	นักเรียน	มาก	2 ครั้ง	ศรียะ โขกกำแพง กรีดข้อมือ
8	หญิง	14	ม,2	นักเรียน	รุนแรง	อาทิตย์ละ 2-3ครั้ง เป็นมา 1 ปี	ศรียะและกำปั่นทุบกำแพง

ผลการศึกษา



Vision : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นโรงพยาบาลตัวอย่าง

ผลการบำบัด




ลำดับ	ชื่อ	ระดับคะแนน ซึมเศร้า ก่อนบำบัด	พยายามฆ่าตัวตายก่อน บำบัด	ระดับคะแนน ซึมเศร้า หลังบำบัด	ความคิดอย่างมีชีวิต อยู่หลังบำบัด
1	นายกอ	มาก	1ครั้ง ผูกคอ	ปกติ	ร้อยละ 100
2	นส.ขอ	รุนแรง	อาทิตย์ละ 1-2ครั้ง กรีดข้อมือ (10+ครั้ง)	ปกติ	ร้อยละ 100
3	นส.คอ	ปานกลาง	มีความคิด	ปกติ	ร้อยละ 100
4	นส.งอ	รุนแรง	มีความคิด	ปกติ	ร้อยละ 100
5	นส.จอ	รุนแรง	3ครั้ง กินยาเกินขนาด	เล็กน้อย	ร้อยละ 100
6	นส.นอ	รุนแรง	3ครั้ง กินยาเกินขนาด	เล็กน้อย	ร้อยละ 100
7	นาย ปอ	มาก	2ครั้ง ศรีษะ โขกกำแพง กรีด ข้อมือ	ปกติ	ร้อยละ 100
8	ชญ.ออ	รุนแรง	อาทิตย์ละ 2-3ครั้ง ศรีษะและ กำปั้นทุบกำแพง ประมาณ 1 ปี	เล็กน้อย	ร้อยละ 100

ภาวะซึมเศร้าหลังการบำบัด



- ค่าคะแนน PHQ-A อยู่ในระดับปกติ จำนวน 5 คน คิดเป็น ร้อยละ 62.5 ระดับเล็กน้อย จำนวน 3 คน คิดเป็น ร้อยละ 37.5 มีความคิดอยากมีชีวิตอยู่ ร้อยละ 100 ทุกคน และสามารถรังสรรค์สิ่งดีๆ ได้



Vision : โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลตัวอย่าง

การสร้างสายใยรักษาโรคซึมเศร้า



เมื่อวาน

คุณหมอคะ

16:46 น.

คือรุ่นพี่ที่หนูรู้จักเค้าจะฆ่าตัวตายอะ
ค่ะ

16:46 น.



เค้ามีประวัติโรค
ใจเสาะมา
พี่ยาพาอะไรอะไปคิดแบบนี้

16:46 น.

หนูไม่รู้จะช่วยเหลือยังไง

16:46 น.



5:24

17:22 น.

หมอคะ

19:06 น.

มีพี่คนนึงเค้าอยากปรึกษาเรื่องอาการ
น้องเขาอะคะ

19:08 น.

พี่เขาบอกว่าน้องเขาโดดแต่ตัวเอง
เก็บตัวไม่อยากไปไหนเลยอยาก
ปรึกษาหมออะคะ

19:09 น.

หมอว่างแล้วตอบหนูด้วยนะคะ

19:09 น.

อ่านแล้ว
19:13 น.

แนะนำให้พี่เขามาโรงพยาบาลได้ไหมคะ

อ่านแล้ว
19:13 น.

อาทิตย์นี้หมออยู่โรงพยาบาลทุกวันคะ

อ่านแล้ว
19:14 น.



Vision : โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลตัวอย่าง

จุดเด่นการบำบัด



การผนวกการบำบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจไว้ในช่วงแรกการบำบัด และทุกระยะของการบำบัด ทำให้มีความคุ้มค่าในการเปลี่ยนแปลงความคิด พฤติกรรมได้เร็วขึ้น

จุดสำคัญ มีการเสริมแรงกระตุ้นและแรงสนับสนุนทางสังคม

การสร้างมีส่วนร่วมของบุคคลที่มีส่วนสำคัญ ส่งเสริมให้เกิดขึ้นได้ตลอดการบำบัด

มีการปรึกษาและ ติดตามทางโทรศัพท์และกลุ่ม Line

Vision : โรงพยาบาลอุเชิยวเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลตัวอย่าง

ขอบพระคุณ



ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยซึมเศร้า



Vision : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นโรงพยาบาลตัวอย่าง

ขอน้อมรับคำแนะนำ



Vision : โรงพยาบาลอุเชิยวณเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลตัวอย่าง